Impfkalender 2021

Kinder- und Jugendarztpraxis ▪ Wenk - Dörr - Loichinger, Eisenbahnstr. 1, 72072 Tübingen

	6 Wo	(2-) 3 Monate	+1 M	(4-) 6 Monate	+1 M	6 - 8 Monate	11 - 12 Monate	12 - 13 Monate	+1 M	14 - 15 Monate	2 Jahre	7 - 8 Jahre	9 - 14 (-17) J.	17 - 18 Jahre	ab 60 Jahre
	(U3)	U4		U5		Frühgeborene	U6	(U6)			U7	U10	(J1)	(J2)	
Tetanus														alle 10 Jahre	
Diphtherie															
Keuchhusten															
Kinderlähmung															
HiB															
Hepatitis B													Nachholimpfung 3-fach		
Pneumokokken 13															
Meningokokken B			1.		2.				3.						
Rotaviren	optional	optional													
Meningokokken C															
Masern															
Mumps															
Röteln															
Windpocken													Nachholimpfung 2-fach		
Pneumokokken 23											ab 2 J., alle 6 J.				
HPV													2 (- 3) Impfg.		
Influenza optional	jährlich > 1 J.														
FSME	>1 Jahr opt.														
Gürtelrose															Shingrix 2-fach
Covid-19	n.d.														
Hepatitis A	optional Reise														

Allgemein:
Zwischen (Kombi)Impfungen ist empfohlen mindestens 4 Wochen Zeitabstand einzuhalten (Ausnahme: Notwendige Schnellimmunisierungen)
Bei versäumten oder verspäteten Impfungen individuelles Impfschema ärztlich abklären

Abkürzungen im Text:
HiB = Haemophilus influenzae Tyyp B
HPV = Humane Papillomaviren
FSME = Frühsommermeningoenzephalitis